



Dr. Gaston-François Maillard, P.D.
Privat-Docent à la faculté de Médecine
Chirurgie plastique et reconstructive FMH
Chirurgie esthétique, chirurgie de la main

Av. de la Dôle 17
CH-1005 Lausanne

Téléphone 021 323 66 66
No urgent 021 323 66 59
Fax 021 323 66 10
E-mail info@drmaillard.ch

BOTOX® – Toxine botulinique

Il s'agit d'une substance toxique connue dans le monde médical depuis de nombreuses années et qui est utilisée à doses très diluées (donc sans danger si utilisée correctement), pour paralyser sélectivement certains muscles.

Les premières utilisations ont eu lieu en ophtalmologie, où on a tenté de corriger certains strabismes (loucherie), en paralysant sélectivement un muscle hyperactif.

Ensuite, la deuxième indication a été les spasmes ou tics faciaux, le plus grand succès étant le blepharospasme, ou spasme pathologique des paupières, les patients gardant les yeux constamment fermés de façon spastique.

L'indication esthétique est : le front contracté, les rides du lion par contracture des muscles corrugateurs et procéus, les pattes d'oie par action exagérée de l'apport sur-orbitaire du muscle orbiculaire des paupières.

L'effet s'instaure au bout de 4 à 7 jours après l'injection qui se fait sans anesthésie, avec de très petites aiguilles et avec des doses infinitésimales et millimétrées très exactement.

L'effet dure 4 à 6 mois, puis il faut refaire l'injection. En principe, au bout de 4 à 6/7 injections, le muscle hyper-actif s'est atrophié et théoriquement ne devrait pas refaire l'action contractile qui est combattue par ce traitement.

Il s'agit d'un nouveau traitement très fiable et qui n'est à proprement parler pas chirurgical, cependant il va de soi qu'un chirurgien qui connaît bien la chirurgie sera probablement plus précis qu'un autre praticien dans ce domaine.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GFM' with a stylized flourish at the end.

Dr G.-F. Maillard, Privat-Docent