



Dr. Gaston-François Maillard, P.D.
Privat-Dozent à la faculté de Médecine
Chirurgie plastique et reconstructive FMH
Chirurgie esthétique, chirurgie de la main

Av. de la Dôle 17
CH-1005 Lausanne

Téléphone 021 323 66 66
No urgent 021 323 66 59
Fax 021 323 66 10
E-mail info@drmaillard.ch

AUGENLIDPLASTIK

Die Augenlidplastik ist eine bei Frauen und Männern häufig praktizierte Operation (vielleicht sogar die am meisten durchgeführte plastisch-ästhetische Operation im Gesicht).

Die Alterung der Augenpartie des Gesichts äussert sich durch folgende Elemente:

1. Herunterfallen der Augenbraue
2. Verlust der Straffheit der Haut und des darunterliegenden Fettgewebes
3. Verlust der Straffheit der Bindegewebemembran, welche die Augenhöhle nach vorne abschliesst und stabilisiert
4. Auftreten von Tränensäcken (Fetthernien)
5. Alterung der Haut.

Eine gute Analyse der Situation ist wichtig, da die therapeutischen Massnahmen von einer präzisen Diagnose abhängen.

Die einfachste kosmetische Behandlung ist die Verschreibung von vitamin-A-haltigen Anti-Alterungs-Cremen.

Leichtes Peeling mit TCA (Trichloressigsäure) genannt Obagi.

CO₂-Laserabrasion mit Sharplan oder Coherent Scanner

Chirurgische Korrektur durch Entfernung des überschüssigen Haut- und Fettgewebes (Blepharochalasis) durch spindelförmige Excision in der Falte des Oberlids, wo die Narbe kaum sichtbar ist.

Straffung des unteren Augenlids durch eine scharf an den Augenwimpern angelegte Inzision. Dies erlaubt gleichzeitig Fetthernien und eventuelle Augenringe zu korrigieren.

Correction of eyebrow droop by a minor forehead lift.

Manchmal, wenn es die Hautqualität erlaubt, ist es möglich, die unteren Fetthernien mittels eines transkonjunktivalen Zugangs zu entfernen, das heisst ohne sichtbare Narbe.

Korrektur der Augenbrauenposition durch ein minimales supraziliäres Lifting oder ein Stirnlifting.

In einigen Fällen wird der Chirurg vorschlagen, den gesamten kapsulo-ligamentären und muskulären Apparat neu zu straffen und schlägt ein Stirnlifting, d.h. ein subperiostales Lifting mit oder ohne Canthopexie (Repositionierung der seitlichen Fixierung des kapsulo-ligamentären

Aufhängeapparates der Augenpartie. Dies ist angezeigt, falls die Augenbrauen seitlich abfallen und der Augenpartie des Gesichts einen traurigen Ausdruck verleihen, und bei « Scleral show », d.h. beim Sichtbarwerden des weissen Augenteils unterhalb der Iris oder Regenbogenhaut)

Die meisten von diesen Eingriffen sind rein ästhetischer Natur und gehen nicht vom Versicherungskatalog abgedeckt auf die Kosten der Patienten/innen. In einigen Fällen jedoch geht das Abfallen (Ptose) des oberen Augenlids mit einer Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes einher und eine Deckung der Kosten durch die Krankenkasse kann beantragt werden.

All diese Punkte müssen vor der Operation so klar wie möglich diskutiert werden, während der Wahl der Technik und Erstellung des Kostenvoranschlags.

In einem gewissen Prozentsatz der Fälle können diese orbito-palpebralen Eingriffe mit Verjüngungstechniken wie Face Lift kombiniert werden.

Es handelt sich um eine häufig praktizierte Chirurgie mit einem geringen Komplikationsrate, falls vom Spezialisten realisiert.

Unserer Meinung nach kommt hier der ästhetische Sinn des Plastischen Chirurgen am meisten zu tragen.

Die Erfolgsquote dieser einfachen Operation ist sehr hoch. Retuschen sind immer möglich.



Dr G.-F.Maillard, Privat-Dozent